

表 1269 大腿骨頸部骨折の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

総コレステロール 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	6,054 (94.0)	387 (6.0)	6,441 (100.0)	29	1,360	7,830
100～ (%)	17,573 (94.9)	938 (5.1)	18,511 (100.0)	57	4,154	22,722
120～ (%)	33,009 (95.4)	1,585 (4.6)	34,594 (100.0)	89	7,518	42,201
140～ (%)	38,214 (95.9)	1,633 (4.1)	39,847 (100.0)	91	8,721	48,659
160～ (%)	31,843 (96.1)	1,299 (3.9)	33,142 (100.0)	67	7,034	40,243
180～ (%)	20,120 (96.2)	786 (3.8)	20,906 (100.0)	38	4,581	25,525
200～ (%)	10,782 (96.3)	420 (3.7)	11,202 (100.0)	28	2,493	13,723
220～ (%)	4,744 (96.1)	192 (3.9)	4,936 (100.0)	9	1,126	6,071
240～ (%)	1,897 (96.2)	74 (3.8)	1,971 (100.0)	3	426	2,400
260～ (%)	1,215 (96.4)	46 (3.6)	1,261 (100.0)	9	316	1,586
合計 (%)	165,451 (95.7)	7,360 (4.3)	172,811 (100.0)	420	37,729	210,960
記載なし (%)	59,283 (95.5)	2,763 (4.5)	62,046 (100.0)	536	36,566	99,148
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	156.00	151.87	155.83	151.83	156.06	155.86
標準偏差	35.60	36.29	35.64	39.98	36.13	35.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査