

表 1270 大腿骨頸部骨折の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	608	46	654	5	137	796
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
20～	12,412	567	12,979	41	2,603	15,623
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
30～	36,396	1,665	38,061	135	7,651	45,847
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
40～	40,613	1,908	42,521	139	8,692	51,352
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
50～	29,679	1,319	30,998	103	6,460	37,561
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
60～	17,740	671	18,411	48	3,777	22,236
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
70～	8,727	295	9,022	29	1,941	10,992
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
80～	4,154	131	4,285	11	933	5,229
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
90～	1,808	60	1,868	3	460	2,331
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
100～	1,505	54	1,559	4	438	2,001
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
合計	153,642	6,716	160,358	518	33,092	193,968
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
記載なし	71,092	3,407	74,499	438	41,203	116,140
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
総計	224,734	10,123	234,857	956	74,295	310,108
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
平均	48.70	47.22	48.64	47.19	49.31	48.75
標準偏差	16.60	15.66	16.57	16.26	17.35	16.71

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査