

表 1271 大腿骨頸部骨折の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（透析患者全体）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満	2,638	138	2,776	12	622	3,410
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
50～	12,412	608	13,020	47	3,034	16,101
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
70～	27,660	1,378	29,038	74	6,457	35,569
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
90～	33,233	1,494	34,727	96	7,555	42,378
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
110～	27,005	1,142	28,147	70	5,986	34,203
(%)	(95.9)	(4.1)	(100.0)			
130～	16,568	669	17,237	35	3,691	20,963
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
150～	8,312	323	8,635	26	1,929	10,590
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
170～	3,765	152	3,917	7	798	4,722
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
190～	1,453	45	1,498	3	308	1,809
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
210～	847	38	885	6	233	1,124
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
合計	133,893	5,987	139,880	376	30,613	170,869
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
記載なし	90,841	4,136	94,977	580	43,682	139,239
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
総計	224,734	10,123	234,857	956	74,295	310,108
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
平均	107.30	104.41	107.18	104.40	106.67	107.08
標準偏差	33.54	33.27	33.54	36.04	33.90	33.61

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査