

表 1272 大腿骨頸部骨折の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前収縮期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	30 (96.8)	1 (3.2)	31 (100.0)		9	40
60～ (%)	325 (90.8)	33 (9.2)	358 (100.0)	1	74	433
80～ (%)	2,573 (92.6)	205 (7.4)	2,778 (100.0)	9	551	3,338
100～ (%)	13,855 (94.9)	751 (5.1)	14,606 (100.0)	33	2,968	17,607
120～ (%)	42,275 (95.5)	1,973 (4.5)	44,248 (100.0)	120	8,903	53,271
140～ (%)	64,552 (96.1)	2,620 (3.9)	67,172 (100.0)	175	13,475	80,822
160～ (%)	46,190 (96.0)	1,919 (4.0)	48,109 (100.0)	118	9,968	58,195
180～ (%)	17,570 (95.6)	816 (4.4)	18,386 (100.0)	54	3,784	22,224
200～ (%)	4,401 (96.0)	185 (4.0)	4,586 (100.0)	9	951	5,546
220～ (%)	919 (95.8)	40 (4.2)	959 (100.0)	2	199	1,160
合計 (%)	192,690 (95.8)	8,543 (4.2)	201,233 (100.0)	521	40,882	242,636
記載なし (%)	32,044 (95.3)	1,580 (4.7)	33,624 (100.0)	435	33,413	67,472
総計 (%)	224,734 (95.7)	10,123 (4.3)	234,857 (100.0)	956	74,295	310,108
平均	151.16	149.25	151.08	150.58	151.39	151.13
標準偏差	24.14	25.75	24.21	24.55	24.29	24.23

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査