

表 1273 大腿骨頸部骨折の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（透析患者全体）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	57	7	64		16	80
(%)	(89.1)	(10.9)	(100.0)			
20～	582	57	639	4	153	796
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
40～	15,819	1,187	17,006	44	3,430	20,480
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
60～	88,400	4,446	92,846	270	18,762	111,878
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
80～	47,822	1,661	49,483	104	10,100	59,687
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
90～	25,897	805	26,702	63	5,486	32,251
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
100～	12,735	334	13,069	32	2,670	15,771
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
120～	786	15	801	2	161	964
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
140～	61	1	62		13	75
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
合計	192,159	8,513	200,672	519	40,791	241,982
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
記載なし	32,575	1,610	34,185	437	33,504	68,126
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
総計	224,734	10,123	234,857	956	74,295	310,108
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
平均	77.93	73.60	77.75	76.47	77.92	77.77
標準偏差	14.42	14.38	14.44	14.60	14.47	14.45

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査