

表 1276 大腿骨頸部骨折の既往 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	8 (100.0)		8 (100.0)	1	3	12
15歳～ (%)	539 (99.1)	5 (0.9)	544 (100.0)	3	110	657
30歳～ (%)	7,940 (98.8)	94 (1.2)	8,034 (100.0)	34	1,734	9,802
45歳～ (%)	31,822 (98.2)	581 (1.8)	32,403 (100.0)	127	7,055	39,585
60歳～ (%)	82,163 (96.5)	2,958 (3.5)	85,121 (100.0)	331	18,926	104,378
75歳～ (%)	53,740 (92.8)	4,157 (7.2)	57,897 (100.0)	288	12,447	70,632
90歳～ (%)	2,807 (86.5)	438 (13.5)	3,245 (100.0)	19	625	3,889
合計 (%)	179,019 (95.6)	8,233 (4.4)	187,252 (100.0)	803	40,900	228,955
不明 (%)	8 (100.0)		8 (100.0)		8	16
記載なし (%)						
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	67.78	74.80	68.09	69.02	68.02	68.08
標準偏差	12.33	10.76	12.35	12.91	12.16	12.32

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査