

表 1277 大腿骨頸部骨折の既往 透析歴(年)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	40,444 (97.2)	1,170 (2.8)	41,614 (100.0)	217	8,884	50,715
2年～ (%)	45,288 (95.7)	2,053 (4.3)	47,341 (100.0)	209	10,739	58,289
5年～ (%)	45,982 (94.8)	2,535 (5.2)	48,517 (100.0)	198	10,512	59,227
10年～ (%)	23,346 (95.0)	1,233 (5.0)	24,579 (100.0)	92	5,361	30,032
15年～ (%)	11,914 (95.4)	568 (4.6)	12,482 (100.0)	45	2,722	15,249
20年～ (%)	6,263 (95.7)	279 (4.3)	6,542 (100.0)	24	1,365	7,931
25年～ (%)	3,163 (95.6)	146 (4.4)	3,309 (100.0)	11	724	4,044
30年～ (%)	1,676 (92.9)	128 (7.1)	1,804 (100.0)	4	375	2,183
35年～ (%)	782 (90.1)	86 (9.9)	868 (100.0)	2	163	1,033
40年～ (%)	147 (80.8)	35 (19.2)	182 (100.0)		39	221
合計 (%)	179,005 (95.6)	8,233 (4.4)	187,238 (100.0)	802	40,884	228,924
不明 (%)	22 (100.0)		22 (100.0)	1	24	47
記載なし (%)						
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	6.94	8.08	6.99	6.06	6.93	6.98
標準偏差	7.02	7.65	7.06	6.38	6.96	7.04

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査