

表 1278 大腿骨頭部骨折の既往 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	53,851	2,155	56,006	199	12,372	68,577
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	1,721	91	1,812	3	350	2,165
(%)	(95.0)	(5.0)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	1,466	60	1,526	7	301	1,834
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	834	52	886	3	175	1,064
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	726	37	763		186	949
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	6,562	196	6,758	27	1,413	8,198
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
腎硬化症	17,137	810	17,947	102	3,411	21,460
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
悪性高血圧	1,485	50	1,535	5	341	1,881
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
糖尿病性腎症	70,369	3,504	73,873	304	16,330	90,507
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
SLE腎炎	1,208	94	1,302	4	244	1,550
(%)	(92.8)	(7.2)	(100.0)			
アミロイド腎	242	18	260	3	62	325
(%)	(93.1)	(6.9)	(100.0)			
痛風腎	685	18	703	3	122	828
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	145	3	148		29	177
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	118	11	129		29	158
(%)	(91.5)	(8.5)	(100.0)			
腎・尿路結石	335	14	349	1	80	430
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	543	11	554	1	131	686
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
閉塞性尿路障害	424	16	440		77	517
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
骨髄腫	158	5	163	1	26	190
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
腎形成不全	347	7	354	1	64	419
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
不明	15,257	837	16,094	110	3,921	20,125
(%)	(94.8)	(5.2)	(100.0)			
再導入	1,138	42	1,180	2	235	1,417
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
その他	4,276	202	4,478	27	1,009	5,514
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
合計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査