

表 1284 大腿骨頸部骨折の既往 透析時間(時間/回)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	363	39	402	3	116	521
(%)	(90.3)	(9.7)	(100.0)			
3.0～	19,056	1,163	20,219	141	4,460	24,820
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
3.5～	13,952	831	14,783	75	3,081	17,939
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
4.0～	121,462	5,435	126,897	515	27,586	154,998
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
4.5～	9,488	303	9,791	24	1,863	11,678
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
5.0～	12,381	383	12,764	41	2,782	15,587
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
5.5～	497	10	507		88	595
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
6.0～	835	27	862		132	994
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
6.5～	54	1	55		3	58
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
7.0～	435	8	443		68	511
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
合計	178,523	8,200	186,723	799	40,179	227,701
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
記載なし	504	33	537	4	729	1,270
(%)	(93.9)	(6.1)	(100.0)			
総計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
平均	3.98	3.88	3.97	3.85	3.97	3.97
標準偏差	0.53	0.50	0.52	0.50	0.51	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査