

表 1285 大腿骨頸部骨折の既往 血流量(ml/分)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	35 (92.1)	3 (7.9)	38 (100.0)		6	44
100～ (%)	624 (95.6)	29 (4.4)	653 (100.0)	2	84	739
120～ (%)	1,716 (92.9)	131 (7.1)	1,847 (100.0)	15	286	2,148
140～ (%)	13,931 (92.3)	1,168 (7.7)	15,099 (100.0)	65	2,809	17,973
160～ (%)	4,756 (92.7)	373 (7.3)	5,129 (100.0)	21	751	5,901
180～ (%)	23,894 (93.8)	1,574 (6.2)	25,468 (100.0)	206	4,811	30,485
200～ (%)	79,741 (95.7)	3,588 (4.3)	83,329 (100.0)	281	16,880	100,490
220～ (%)	23,418 (97.4)	618 (2.6)	24,036 (100.0)	97	5,413	29,546
240～ (%)	21,620 (97.7)	513 (2.3)	22,133 (100.0)	88	4,839	27,060
260～ (%)	2,022 (98.1)	40 (1.9)	2,062 (100.0)	7	464	2,533
280～ (%)	1,866 (98.3)	32 (1.7)	1,898 (100.0)	6	433	2,337
300～ (%)	3,334 (98.4)	53 (1.6)	3,387 (100.0)	8	870	4,265
350～ (%)	364 (97.8)	8 (2.2)	372 (100.0)		57	429
400～ (%)	596 (96.9)	19 (3.1)	615 (100.0)		103	718
合計 (%)	177,917 (95.6)	8,149 (4.4)	186,066 (100.0)	796	37,806	224,668
記載なし (%)	1,110 (93.0)	84 (7.0)	1,194 (100.0)	7	3,102	4,303
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	205.12	192.61	204.58	198.37	206.85	204.94
標準偏差	36.64	33.29	36.59	31.63	35.57	36.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査