

表 1289 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	61	8	69		15	84
(%)	(88.4)	(11.6)	(100.0)			
20～	547	118	665	4	133	802
(%)	(82.3)	(17.7)	(100.0)			
30～	14,197	1,805	16,002	66	3,049	19,117
(%)	(88.7)	(11.3)	(100.0)			
40～	46,615	2,975	49,590	214	10,005	59,809
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
50～	57,555	2,033	59,588	241	12,280	72,109
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
60～	35,606	820	36,426	175	7,481	44,082
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
70～	14,025	232	14,257	57	2,870	17,184
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
80～	4,995	54	5,049	18	1,014	6,081
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
90～	1,802	22	1,824	7	364	2,195
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
100～	606	13	619	3	133	755
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
110～	244	3	247	1	51	299
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
120～	160		160		29	189
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	176,413	8,083	184,496	786	37,424	222,706
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
記載なし	2,614	150	2,764	17	3,484	6,265
(%)	(94.6)	(5.4)	(100.0)			
総計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
平均	55.75	48.33	55.43	55.24	55.53	55.45
標準偏差	12.90	11.22	12.92	12.68	12.79	12.90

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査