

表 1290 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	35	4	39		10	49
(%)	(89.7)	(10.3)	(100.0)			
20～	32	2	34		6	40
(%)	(94.1)	(5.9)	(100.0)			
30～	2,079	177	2,256	12	450	2,718
(%)	(92.2)	(7.8)	(100.0)			
40～	20,482	1,004	21,486	82	4,343	25,911
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
50～	42,603	1,324	43,927	175	9,025	53,127
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
60～	30,387	624	31,011	150	6,355	37,516
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
70～	12,360	188	12,548	52	2,547	15,147
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
80～	4,449	50	4,499	15	904	5,418
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
90～	1,614	21	1,635	7	332	1,974
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
100～	553	13	566	3	125	694
(%)	(97.7)	(2.3)	(100.0)			
110～	224	3	227	1	45	273
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
120～	151		151		27	178
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	114,969	3,410	118,379	497	24,169	143,045
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
記載なし	1,728	64	1,792	8	2,188	3,988
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
総計	116,697	3,474	120,171	505	26,357	147,033
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
平均	59.73	54.77	59.59	59.81	59.57	59.58
標準偏差	12.20	10.93	12.19	11.80	12.12	12.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査