

表 1291 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	26	4	30		5	35
(%)	(86.7)	(13.3)	(100.0)			
20～	515	116	631	4	127	762
(%)	(81.6)	(18.4)	(100.0)			
30～	12,118	1,628	13,746	54	2,599	16,399
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
40～	26,133	1,971	28,104	132	5,662	33,898
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
50～	14,952	709	15,661	66	3,255	18,982
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
60～	5,219	196	5,415	25	1,126	6,566
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
70～	1,665	44	1,709	5	323	2,037
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
80～	546	4	550	3	110	663
(%)	(99.3)	(0.7)	(100.0)			
90～	188	1	189		32	221
(%)	(99.5)	(0.5)	(100.0)			
100～	53		53		8	61
(%)	(100.0)		(100.0)			
110～	20		20		6	26
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	9		9		2	11
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	61,444	4,673	66,117	289	13,255	79,661
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
記載なし	886	86	972	9	1,296	2,277
(%)	(91.2)	(8.8)	(100.0)			
総計	62,330	4,759	67,089	298	14,551	81,938
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
平均	48.31	43.64	47.98	47.39	48.18	48.01
標準偏差	10.69	8.86	10.64	10.03	10.52	10.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査