

表 1292 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満	575	34	609	1	145	755
(%)	(94.4)	(5.6)	(100.0)			
0.0～	6,391	555	6,946	49	1,455	8,450
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
1.0～	31,387	2,523	33,910	159	6,956	41,025
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
2.0～	57,807	2,788	60,595	219	12,347	73,161
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
3.0～	30,748	834	31,582	114	6,414	38,110
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
4.0～	7,621	156	7,777	24	1,644	9,445
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
5.0～	1,591	26	1,617	5	336	1,958
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
6.0～	332	5	337	1	57	395
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
7.0～	74	1	75	1	19	95
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
8.0～	131	6	137		23	160
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
合計	136,657	6,928	143,585	573	29,396	173,554
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
記載なし	1,904	135	2,039	12	2,604	4,655
(%)	(93.4)	(6.6)	(100.0)			
総計	138,561	7,063	145,624	585	32,000	178,209
(%)	(95.1)	(4.9)	(100.0)			
平均	2.51	2.10	2.49	2.32	2.48	2.49
標準偏差	1.06	0.97	1.05	1.04	1.03	1.05

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査