

表 1293 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	350 (95.9)	15 (4.1)	365 (100.0)		92	457
0.0～ (%)	3,524 (95.3)	175 (4.7)	3,699 (100.0)	29	772	4,500
1.0～ (%)	15,845 (95.2)	793 (4.8)	16,638 (100.0)	86	3,521	20,245
2.0～ (%)	35,214 (96.7)	1,201 (3.3)	36,415 (100.0)	133	7,486	44,034
3.0～ (%)	24,062 (97.8)	546 (2.2)	24,608 (100.0)	81	4,978	29,667
4.0～ (%)	6,723 (98.2)	121 (1.8)	6,844 (100.0)	20	1,455	8,319
5.0～ (%)	1,469 (98.5)	23 (1.5)	1,492 (100.0)	5	312	1,809
6.0～ (%)	317 (99.1)	3 (0.9)	320 (100.0)	1	55	376
7.0～ (%)	64 (98.5)	1 (1.5)	65 (100.0)	1	17	83
8.0～ (%)	96 (96.0)	4 (4.0)	100 (100.0)		16	116
合計 (%)	87,664 (96.8)	2,882 (3.2)	90,546 (100.0)	356	18,704	109,606
記載なし (%)	1,249 (95.6)	58 (4.4)	1,307 (100.0)	7	1,595	2,909
総計 (%)	88,913 (96.8)	2,940 (3.2)	91,853 (100.0)	363	20,299	112,515
平均	2.68	2.36	2.67	2.45	2.66	2.67
標準偏差	1.10	1.06	1.10	1.11	1.08	1.09

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査