

表 1294 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少量(kg)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

体重減少量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.0未満 (%)	225 (92.2)	19 (7.8)	244 (100.0)	1	53	298
0.0～ (%)	2,867 (88.3)	380 (11.7)	3,247 (100.0)	20	683	3,950
1.0～ (%)	15,542 (90.0)	1,730 (10.0)	17,272 (100.0)	73	3,435	20,780
2.0～ (%)	22,593 (93.4)	1,587 (6.6)	24,180 (100.0)	86	4,861	29,127
3.0～ (%)	6,686 (95.9)	288 (4.1)	6,974 (100.0)	33	1,436	8,443
4.0～ (%)	898 (96.2)	35 (3.8)	933 (100.0)	4	189	1,126
5.0～ (%)	122 (97.6)	3 (2.4)	125 (100.0)		24	149
6.0～ (%)	15 (88.2)	2 (11.8)	17 (100.0)		2	19
7.0～ (%)	10 (100.0)		10 (100.0)		2	12
8.0～ (%)	35 (94.6)	2 (5.4)	37 (100.0)		7	44
合計 (%)	48,993 (92.4)	4,046 (7.6)	53,039 (100.0)	217	10,692	63,948
記載なし (%)	655 (89.5)	77 (10.5)	732 (100.0)	5	1,009	1,746
総計 (%)	49,648 (92.3)	4,123 (7.7)	53,771 (100.0)	222	11,701	65,694
平均	2.19	1.92	2.17	2.10	2.17	2.17
標準偏差	0.90	0.85	0.90	0.87	0.87	0.89

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査