

表 1295 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	2,850 (93.8)	187 (6.2)	3,037 (100.0)	23	636	3,696
1.0～ (%)	5,060 (93.7)	341 (6.3)	5,401 (100.0)	28	1,180	6,609
2.0～ (%)	13,084 (94.3)	793 (5.7)	13,877 (100.0)	70	2,974	16,921
3.0～ (%)	27,267 (94.9)	1,455 (5.1)	28,722 (100.0)	120	5,742	34,584
4.0～ (%)	36,635 (95.4)	1,763 (4.6)	38,398 (100.0)	142	7,875	46,415
5.0～ (%)	28,858 (95.8)	1,262 (4.2)	30,120 (100.0)	103	6,066	36,289
6.0～ (%)	14,581 (95.4)	696 (4.6)	15,277 (100.0)	63	3,087	18,427
7.0～ (%)	5,582 (95.3)	277 (4.7)	5,859 (100.0)	17	1,232	7,108
8.0～ (%)	1,732 (94.9)	93 (5.1)	1,825 (100.0)	5	365	2,195
9.0～ (%)	923 (94.3)	56 (5.7)	979 (100.0)	2	224	1,205
合計 (%)	136,572 (95.2)	6,923 (4.8)	143,495 (100.0)	573	29,381	173,449
記載なし (%)	1,989 (93.4)	140 (6.6)	2,129 (100.0)	12	2,619	4,760
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	4.54	4.40	4.54	4.26	4.52	4.53
標準偏差	1.64	1.75	1.65	1.69	1.67	1.65

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査