

表 1296 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	1,837 (95.9)	79 (4.1)	1,916 (100.0)	15	421	2,352
1.0～ (%)	3,283 (96.0)	137 (4.0)	3,420 (100.0)	18	730	4,168
2.0～ (%)	8,362 (95.9)	357 (4.1)	8,719 (100.0)	51	1,861	10,631
3.0～ (%)	17,730 (96.6)	619 (3.4)	18,349 (100.0)	75	3,697	22,121
4.0～ (%)	23,923 (96.9)	759 (3.1)	24,682 (100.0)	88	5,087	29,857
5.0～ (%)	18,586 (97.3)	515 (2.7)	19,101 (100.0)	62	3,959	23,122
6.0～ (%)	9,129 (97.2)	266 (2.8)	9,395 (100.0)	36	1,909	11,340
7.0～ (%)	3,277 (97.2)	94 (2.8)	3,371 (100.0)	6	708	4,085
8.0～ (%)	971 (97.1)	29 (2.9)	1,000 (100.0)	4	192	1,196
9.0～ (%)	510 (95.7)	23 (4.3)	533 (100.0)	1	130	664
合計 (%)	87,608 (96.8)	2,878 (3.2)	90,486 (100.0)	356	18,694	109,536
記載なし (%)	1,305 (95.5)	62 (4.5)	1,367 (100.0)	7	1,605	2,979
総計 (%)	88,913 (96.8)	2,940 (3.2)	91,853 (100.0)	363	20,299	112,515
平均	4.51	4.32	4.51	4.14	4.50	4.50
標準偏差	1.61	1.69	1.61	1.68	1.64	1.62

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査