

表 1297 大腿骨頸部骨折の既往 体重減少率(%)別 (施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

体重減少率	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.0未満 (%)	1,013 (90.4)	108 (9.6)	1,121 (100.0)	8	215	1,344
1.0～ (%)	1,777 (89.7)	204 (10.3)	1,981 (100.0)	10	450	2,441
2.0～ (%)	4,722 (91.5)	436 (8.5)	5,158 (100.0)	19	1,113	6,290
3.0～ (%)	9,537 (91.9)	836 (8.1)	10,373 (100.0)	45	2,045	12,463
4.0～ (%)	12,712 (92.7)	1,004 (7.3)	13,716 (100.0)	54	2,788	16,558
5.0～ (%)	10,272 (93.2)	747 (6.8)	11,019 (100.0)	41	2,107	13,167
6.0～ (%)	5,452 (92.7)	430 (7.3)	5,882 (100.0)	27	1,178	7,087
7.0～ (%)	2,305 (92.6)	183 (7.4)	2,488 (100.0)	11	524	3,023
8.0～ (%)	761 (92.2)	64 (7.8)	825 (100.0)	1	173	999
9.0～ (%)	413 (92.6)	33 (7.4)	446 (100.0)	1	94	541
合計 (%)	48,964 (92.4)	4,045 (7.6)	53,009 (100.0)	217	10,687	63,913
記載なし (%)	684 (89.8)	78 (10.2)	762 (100.0)	5	1,014	1,781
総計 (%)	49,648 (92.3)	4,123 (7.7)	53,771 (100.0)	222	11,701	65,694
平均	4.60	4.46	4.59	4.46	4.57	4.58
標準偏差	1.69	1.79	1.70	1.70	1.72	1.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査