

表 1299 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	336	24	360		64	424
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
14～	2,400	189	2,589	10	462	3,061
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
16～	10,075	512	10,587	36	1,962	12,585
(%)	(95.2)	(4.8)	(100.0)			
18～	21,396	839	22,235	77	3,955	26,267
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
20～	26,694	724	27,418	123	5,098	32,639
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
22～	21,670	497	22,167	94	4,084	26,345
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
24～	12,915	230	13,145	59	2,444	15,648
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
26～	6,742	91	6,833	35	1,256	8,124
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
28～	3,362	49	3,411	12	615	4,038
(%)	(98.6)	(1.4)	(100.0)			
30～	2,727	46	2,773	10	487	3,270
(%)	(98.3)	(1.7)	(100.0)			
合計	108,317	3,201	111,518	456	20,427	132,401
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
記載なし	8,380	273	8,653	49	5,930	14,632
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
総計	116,697	3,474	120,171	505	26,357	147,033
(%)	(97.1)	(2.9)	(100.0)			
平均	21.85	20.46	21.81	22.04	21.81	21.81
標準偏差	3.50	3.32	3.50	3.37	3.48	3.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査