

表 1300 大腿骨頸部骨折の既往 Body Mass Index別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回）

Body Mass Index	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
14未満	616	124	740	1	146	887
(%)	(83.2)	(16.8)	(100.0)			
14～	3,397	495	3,892	18	635	4,545
(%)	(87.3)	(12.7)	(100.0)			
16～	9,176	952	10,128	38	1,729	11,895
(%)	(90.6)	(9.4)	(100.0)			
18～	13,226	1,066	14,292	63	2,534	16,889
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
20～	11,938	790	12,728	52	2,261	15,041
(%)	(93.8)	(6.2)	(100.0)			
22～	8,327	464	8,791	35	1,639	10,465
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
24～	5,062	241	5,303	27	935	6,265
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
26～	2,850	124	2,974	13	577	3,564
(%)	(95.8)	(4.2)	(100.0)			
28～	1,581	61	1,642	5	306	1,953
(%)	(96.3)	(3.7)	(100.0)			
30～	1,575	43	1,618	9	267	1,894
(%)	(97.3)	(2.7)	(100.0)			
合計	57,748	4,360	62,108	261	11,029	73,398
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
記載なし	4,582	399	4,981	37	3,522	8,540
(%)	(92.0)	(8.0)	(100.0)			
総計	62,330	4,759	67,089	298	14,551	81,938
(%)	(92.9)	(7.1)	(100.0)			
平均	20.92	19.54	20.82	20.99	20.90	20.83
標準偏差	3.85	3.53	3.85	3.92	3.83	3.85

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査