

表 1302 大腿骨頸部骨折の既往 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前クレアチニン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	58 (90.6)	6 (9.4)	64 (100.0)		12	76
2～ (%)	1,185 (86.6)	183 (13.4)	1,368 (100.0)	6	282	1,656
4～ (%)	5,539 (85.7)	922 (14.3)	6,461 (100.0)	35	1,299	7,795
6～ (%)	17,959 (90.0)	2,006 (10.0)	19,965 (100.0)	80	3,961	24,006
8～ (%)	36,204 (94.4)	2,162 (5.6)	38,366 (100.0)	160	7,589	46,115
10～ (%)	38,464 (97.1)	1,164 (2.9)	39,628 (100.0)	148	8,258	48,034
12～ (%)	24,212 (98.4)	384 (1.6)	24,596 (100.0)	85	5,073	29,754
14～ (%)	9,881 (99.1)	88 (0.9)	9,969 (100.0)	41	2,026	12,036
16～ (%)	3,349 (99.2)	26 (0.8)	3,375 (100.0)	15	710	4,100
合計 (%)	136,851 (95.2)	6,941 (4.8)	143,792 (100.0)	570	29,210	173,572
記載なし (%)	1,710 (93.3)	122 (6.7)	1,832 (100.0)	15	2,790	4,637
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	10.38	8.34	10.29	10.14	10.33	10.29
標準偏差	2.76	2.49	2.78	2.86	2.80	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査