

表 1305 大腿骨頸部骨折の既往 single pool Kt/V(Kt/Vsp)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	16	3	19		2	21
(%)	(84.2)	(15.8)	(100.0)			
0.4～	40	5	45		5	50
(%)	(88.9)	(11.1)	(100.0)			
0.6～	137	12	149		29	178
(%)	(91.9)	(8.1)	(100.0)			
0.8～	626	68	694	4	134	832
(%)	(90.2)	(9.8)	(100.0)			
1.0～	2,431	286	2,717	13	480	3,210
(%)	(89.5)	(10.5)	(100.0)			
1.2～	6,651	593	7,244	38	1,445	8,727
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
1.4～	11,981	951	12,932	53	2,528	15,513
(%)	(92.6)	(7.4)	(100.0)			
1.6～	12,309	925	13,234	59	2,367	15,660
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
1.8～	7,559	544	8,103	26	1,608	9,737
(%)	(93.3)	(6.7)	(100.0)			
2.0～	4,846	365	5,211	16	1,159	6,386
(%)	(93.0)	(7.0)	(100.0)			
合計	46,596	3,752	50,348	209	9,757	60,314
(%)	(92.5)	(7.5)	(100.0)			
記載なし	3,052	371	3,423	13	1,944	5,380
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
総計	49,648	4,123	53,771	222	11,701	65,694
(%)	(92.3)	(7.7)	(100.0)			
平均	1.62	1.59	1.62	1.57	1.64	1.62
標準偏差	0.31	0.32	0.31	0.27	0.32	0.31

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査