

表 1306 大腿骨頸部骨折の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	114 (95.0)	6 (5.0)	120 (100.0)		14	134
0.4～ (%)	305 (94.7)	17 (5.3)	322 (100.0)	2	42	366
0.6～ (%)	2,233 (95.1)	116 (4.9)	2,349 (100.0)	14	475	2,838
0.8～ (%)	12,009 (95.4)	576 (4.6)	12,585 (100.0)	61	2,394	15,040
1.0～ (%)	33,850 (95.7)	1,522 (4.3)	35,372 (100.0)	166	6,857	42,395
1.2～ (%)	41,184 (95.6)	1,912 (4.4)	43,096 (100.0)	163	8,509	51,768
1.4～ (%)	24,767 (94.9)	1,329 (5.1)	26,096 (100.0)	101	5,126	31,323
1.6～ (%)	10,266 (94.3)	623 (5.7)	10,889 (100.0)	32	2,276	13,197
1.8～ (%)	3,350 (93.9)	217 (6.1)	3,567 (100.0)	12	798	4,377
2.0～ (%)	1,852 (93.9)	120 (6.1)	1,972 (100.0)	1	515	2,488
合計 (%)	129,930 (95.3)	6,438 (4.7)	136,368 (100.0)	552	27,006	163,926
記載なし (%)	8,631 (93.2)	625 (6.8)	9,256 (100.0)	33	4,994	14,283
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	1.29	1.32	1.29	1.25	1.30	1.29
標準偏差	0.27	0.28	0.27	0.25	0.28	0.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査