

表 1307 大腿骨頸部骨折の既往 equilibrated Kt/V (eKt/V) 別 (施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満	90	1	91		12	103
(%)	(98.9)	(1.1)	(100.0)			
0.4～	218	10	228	2	29	259
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
0.6～	1,785	64	1,849	12	380	2,241
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
0.8～	9,774	303	10,077	45	1,932	12,054
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
1.0～	26,870	854	27,724	127	5,374	33,225
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
1.2～	28,276	881	29,157	107	5,770	35,034
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
1.4～	11,637	412	12,049	40	2,600	14,689
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
1.6～	3,307	107	3,414	9	752	4,175
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
1.8～	860	35	895	1	248	1,144
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
2.0～	485	16	501		146	647
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
合計	83,302	2,683	85,985	343	17,243	103,571
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
記載なし	5,611	257	5,868	20	3,056	8,944
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
総計	88,913	2,940	91,853	363	20,299	112,515
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
平均	1.22	1.23	1.22	1.18	1.24	1.23
標準偏差	0.23	0.24	0.23	0.22	0.24	0.24

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査