

表 1308 大腿骨頸部骨折の既往 equilibrated Kt/V(eKt/V)別 (施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

equilibrated Kt/V (eKt/V)	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	24 (82.8)	5 (17.2)	29 (100.0)		2	31
0.4～ (%)	87 (92.6)	7 (7.4)	94 (100.0)		13	107
0.6～ (%)	448 (89.6)	52 (10.4)	500 (100.0)	2	95	597
0.8～ (%)	2,235 (89.1)	273 (10.9)	2,508 (100.0)	16	462	2,986
1.0～ (%)	6,980 (91.3)	668 (8.7)	7,648 (100.0)	39	1,483	9,170
1.2～ (%)	12,908 (92.6)	1,031 (7.4)	13,939 (100.0)	56	2,739	16,734
1.4～ (%)	13,130 (93.5)	917 (6.5)	14,047 (100.0)	61	2,526	16,634
1.6～ (%)	6,959 (93.1)	516 (6.9)	7,475 (100.0)	23	1,524	9,022
1.8～ (%)	2,490 (93.2)	182 (6.8)	2,672 (100.0)	11	550	3,233
2.0～ (%)	1,367 (92.9)	104 (7.1)	1,471 (100.0)	1	369	1,841
合計 (%)	46,628 (92.5)	3,755 (7.5)	50,383 (100.0)	209	9,763	60,355
記載なし (%)	3,020 (89.1)	368 (10.9)	3,388 (100.0)	13	1,938	5,339
総計 (%)	49,648 (92.3)	4,123 (7.7)	53,771 (100.0)	222	11,701	65,694
平均	1.41	1.38	1.41	1.36	1.42	1.41
標準偏差	0.29	0.30	0.29	0.25	0.30	0.29

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査