

表 1309 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	291 (90.9)	29 (9.1)	320 (100.0)	2	47	369
0.4～ (%)	6,364 (91.5)	588 (8.5)	6,952 (100.0)	39	1,427	8,418
0.6～ (%)	40,164 (94.3)	2,406 (5.7)	42,570 (100.0)	158	8,228	50,956
0.8～ (%)	56,146 (95.9)	2,393 (4.1)	58,539 (100.0)	224	11,748	70,511
1.0～ (%)	22,620 (96.3)	876 (3.7)	23,496 (100.0)	103	4,649	28,248
1.2～ (%)	3,933 (96.7)	136 (3.3)	4,069 (100.0)	23	824	4,916
1.4～ (%)	445 (97.4)	12 (2.6)	457 (100.0)	3	95	555
1.6～ (%)	62 (95.4)	3 (4.6)	65 (100.0)		14	79
1.8～ (%)	21 (95.5)	1 (4.5)	22 (100.0)		3	25
2.0～ (%)	32 (94.1)	2 (5.9)	34 (100.0)		4	38
合計 (%)	130,078 (95.3)	6,446 (4.7)	136,524 (100.0)	552	27,039	164,115
記載なし (%)	8,483 (93.2)	617 (6.8)	9,100 (100.0)	33	4,961	14,094
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	0.86	0.82	0.86	0.86	0.86	0.86
標準偏差	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査