

表 1310 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	191 (93.2)	14 (6.8)	205 (100.0)	1	32	238
0.4～ (%)	4,241 (94.2)	261 (5.8)	4,502 (100.0)	27	926	5,455
0.6～ (%)	27,368 (96.2)	1,079 (3.8)	28,447 (100.0)	106	5,580	34,133
0.8～ (%)	36,268 (97.4)	965 (2.6)	37,233 (100.0)	140	7,602	44,975
1.0～ (%)	13,074 (97.7)	312 (2.3)	13,386 (100.0)	58	2,658	16,102
1.2～ (%)	1,969 (97.5)	50 (2.5)	2,019 (100.0)	9	400	2,428
1.4～ (%)	218 (98.6)	3 (1.4)	221 (100.0)	2	49	272
1.6～ (%)	28 (96.6)	1 (3.4)	29 (100.0)		5	34
1.8～ (%)	11 (91.7)	1 (8.3)	12 (100.0)		2	14
2.0～ (%)	24 (96.0)	1 (4.0)	25 (100.0)		3	28
合計 (%)	83,392 (96.9)	2,687 (3.1)	86,079 (100.0)	343	17,257	103,679
記載なし (%)	5,521 (95.6)	253 (4.4)	5,774 (100.0)	20	3,042	8,836
総計 (%)	88,913 (96.8)	2,940 (3.2)	91,853 (100.0)	363	20,299	112,515
平均	0.85	0.81	0.85	0.84	0.85	0.85
標準偏差	0.17	0.18	0.17	0.19	0.17	0.17

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査