

表 1311 大腿骨頸部骨折の既往 nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.4未満 (%)	100 (87.0)	15 (13.0)	115 (100.0)	1	15	131
0.4～ (%)	2,123 (86.7)	327 (13.3)	2,450 (100.0)	12	501	2,963
0.6～ (%)	12,796 (90.6)	1,327 (9.4)	14,123 (100.0)	52	2,648	16,823
0.8～ (%)	19,878 (93.3)	1,428 (6.7)	21,306 (100.0)	84	4,146	25,536
1.0～ (%)	9,546 (94.4)	564 (5.6)	10,110 (100.0)	45	1,991	12,146
1.2～ (%)	1,964 (95.8)	86 (4.2)	2,050 (100.0)	14	424	2,488
1.4～ (%)	227 (96.2)	9 (3.8)	236 (100.0)	1	46	283
1.6～ (%)	34 (94.4)	2 (5.6)	36 (100.0)		9	45
1.8～ (%)	10 (100.0)		10 (100.0)		1	11
2.0～ (%)	8 (88.9)	1 (11.1)	9 (100.0)		1	10
合計 (%)	46,686 (92.5)	3,759 (7.5)	50,445 (100.0)	209	9,782	60,436
記載なし (%)	2,962 (89.1)	364 (10.9)	3,326 (100.0)	13	1,919	5,258
総計 (%)	49,648 (92.3)	4,123 (7.7)	53,771 (100.0)	222	11,701	65,694
平均	0.88	0.83	0.88	0.89	0.88	0.88
標準偏差	0.18	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査