

表 1312 大腿骨頸部骨折の既往 %クレアチニン産生速度(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	9,369 (89.9)	1,051 (10.1)	10,420 (100.0)	55	2,075	12,550
60～ (%)	6,965 (91.7)	630 (8.3)	7,595 (100.0)	39	1,491	9,125
70～ (%)	10,952 (93.2)	798 (6.8)	11,750 (100.0)	44	2,160	13,954
80～ (%)	15,461 (94.1)	976 (5.9)	16,437 (100.0)	69	3,177	19,683
90～ (%)	19,801 (95.3)	968 (4.7)	20,769 (100.0)	77	4,012	24,858
100～ (%)	21,319 (96.3)	813 (3.7)	22,132 (100.0)	89	4,374	26,595
110～ (%)	19,185 (96.9)	610 (3.1)	19,795 (100.0)	78	3,981	23,854
120～ (%)	14,000 (97.6)	339 (2.4)	14,339 (100.0)	59	2,940	17,338
130～ (%)	7,752 (98.1)	147 (1.9)	7,899 (100.0)	20	1,689	9,608
140～ (%)	5,196 (97.9)	111 (2.1)	5,307 (100.0)	22	1,120	6,449
合計 (%)	130,000 (95.3)	6,443 (4.7)	136,443 (100.0)	552	27,019	164,014
記載なし (%)	8,561 (93.2)	620 (6.8)	9,181 (100.0)	33	4,981	14,195
総計 (%)	138,561 (95.1)	7,063 (4.9)	145,624 (100.0)	585	32,000	178,209
平均	99.25	86.37	98.65	96.42	99.27	98.74
標準偏差	25.70	26.86	25.90	26.40	26.21	25.96

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査