

表 1314 大腿骨頸部骨折の既往 %クレアチニン産生速度(%)別（施設血液透析患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

%クレアチニン 産生速度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	3,579 (84.1)	677 (15.9)	4,256 (100.0)	21	849	5,126
60～ (%)	2,424 (87.2)	356 (12.8)	2,780 (100.0)	12	547	3,339
70～ (%)	3,806 (89.6)	442 (10.4)	4,248 (100.0)	13	784	5,045
80～ (%)	5,430 (90.7)	556 (9.3)	5,986 (100.0)	29	1,109	7,124
90～ (%)	6,927 (92.7)	546 (7.3)	7,473 (100.0)	36	1,360	8,869
100～ (%)	7,687 (94.2)	476 (5.8)	8,163 (100.0)	34	1,580	9,777
110～ (%)	7,012 (95.3)	343 (4.7)	7,355 (100.0)	24	1,412	8,791
120～ (%)	5,216 (96.1)	211 (3.9)	5,427 (100.0)	19	1,073	6,519
130～ (%)	2,790 (96.9)	88 (3.1)	2,878 (100.0)	11	620	3,509
140～ (%)	1,788 (96.6)	62 (3.4)	1,850 (100.0)	10	438	2,298
合計 (%)	46,659 (92.5)	3,757 (7.5)	50,416 (100.0)	209	9,772	60,397
記載なし (%)	2,989 (89.1)	366 (10.9)	3,355 (100.0)	13	1,929	5,297
総計 (%)	49,648 (92.3)	4,123 (7.7)	53,771 (100.0)	222	11,701	65,694
平均	99.19	85.62	98.18	96.93	98.96	98.30
標準偏差	26.00	27.62	26.36	26.66	27.11	26.49

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査