

表 1315 大腿骨頸部骨折の既往 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前アルブミン 濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	121 (93.8)	8 (6.2)	129 (100.0)	1	16	146
1.5～ (%)	577 (91.6)	53 (8.4)	630 (100.0)	7	134	771
2.0～ (%)	2,416 (90.4)	256 (9.6)	2,672 (100.0)	25	482	3,179
2.5～ (%)	9,251 (90.6)	964 (9.4)	10,215 (100.0)	65	1,870	12,150
3.0～ (%)	40,738 (93.6)	2,783 (6.4)	43,521 (100.0)	199	8,362	52,082
3.5～ (%)	85,969 (96.5)	3,123 (3.5)	89,092 (100.0)	343	17,700	107,135
4.0～ (%)	32,617 (97.8)	743 (2.2)	33,360 (100.0)	133	7,013	40,506
4.5～ (%)	1,935 (98.2)	35 (1.8)	1,970 (100.0)	6	386	2,362
5.0～ (%)	150 (96.8)	5 (3.2)	155 (100.0)		17	172
合計 (%)	173,774 (95.6)	7,970 (4.4)	181,744 (100.0)	779	35,980	218,503
記載なし (%)	5,253 (95.2)	263 (4.8)	5,516 (100.0)	24	4,928	10,468
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	3.61	3.39	3.60	3.51	3.61	3.60
標準偏差	0.44	0.48	0.44	0.51	0.44	0.44

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査