

表 1316 大腿骨頸部骨折の既往 透析前CRP濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前CRP濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
0.2未満 (%)	85,002 (96.4)	3,200 (3.6)	88,202 (100.0)	292	17,035	105,529
0.2～ (%)	28,331 (95.1)	1,471 (4.9)	29,802 (100.0)	110	5,466	35,378
0.5～ (%)	14,312 (94.5)	836 (5.5)	15,148 (100.0)	57	2,942	18,147
1.0～ (%)	9,291 (93.9)	607 (6.1)	9,898 (100.0)	47	1,827	11,772
2.0～ (%)	5,679 (93.3)	409 (6.7)	6,088 (100.0)	31	1,135	7,254
4.0～ (%)	1,990 (92.6)	160 (7.4)	2,150 (100.0)	14	418	2,582
6.0～ (%)	987 (92.0)	86 (8.0)	1,073 (100.0)	9	200	1,282
8.0～ (%)	533 (92.2)	45 (7.8)	578 (100.0)	2	114	694
10.0～ (%)	661 (91.3)	63 (8.7)	724 (100.0)	5	113	842
15.0～ (%)	434 (91.8)	39 (8.2)	473 (100.0)	5	82	560
合計 (%)	147,220 (95.5)	6,916 (4.5)	154,136 (100.0)	572	29,332	184,040
記載なし (%)	31,807 (96.0)	1,317 (4.0)	33,124 (100.0)	231	11,576	44,931
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	0.63	0.97	0.65	1.00	0.62	0.64
標準偏差	1.95	2.43	1.98	2.68	1.72	1.94

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査