

表 1318 大腿骨頸部骨折の既往 透析前リン濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前リン濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3未満 (%)	6,746 (91.4)	634 (8.6)	7,380 (100.0)	31	1,550	8,961
3.0～ (%)	8,477 (93.5)	585 (6.5)	9,062 (100.0)	39	1,879	10,980
3.5～ (%)	14,984 (94.5)	880 (5.5)	15,864 (100.0)	67	3,087	19,018
4.0～ (%)	22,331 (95.0)	1,179 (5.0)	23,510 (100.0)	95	4,587	28,192
4.5～ (%)	26,675 (95.6)	1,219 (4.4)	27,894 (100.0)	121	5,453	33,468
5.0～ (%)	26,885 (95.9)	1,151 (4.1)	28,036 (100.0)	108	5,665	33,809
5.5～ (%)	23,267 (96.4)	863 (3.6)	24,130 (100.0)	93	4,789	29,012
6.0～ (%)	3,929 (96.4)	148 (3.6)	4,077 (100.0)	16	835	4,928
6.1～ (%)	13,168 (96.5)	478 (3.5)	13,646 (100.0)	62	2,797	16,505
6.5～ (%)	11,566 (96.9)	372 (3.1)	11,938 (100.0)	51	2,388	14,377
7.0～ (%)	7,087 (96.9)	229 (3.1)	7,316 (100.0)	27	1,517	8,860
7.5～ (%)	4,302 (97.0)	131 (3.0)	4,433 (100.0)	23	903	5,359
8.0～ (%)	2,568 (97.4)	69 (2.6)	2,637 (100.0)	9	546	3,192
8.5～ (%)	1,620 (97.1)	48 (2.9)	1,668 (100.0)	6	349	2,023
9.0～ (%)	2,505 (97.4)	66 (2.6)	2,571 (100.0)	22	563	3,156
合計 (%)	176,110 (95.6)	8,052 (4.4)	184,162 (100.0)	770	36,908	221,840
記載なし (%)	2,917 (94.2)	181 (5.8)	3,098 (100.0)	33	4,000	7,131
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	5.21	4.82	5.19	5.25	5.21	5.20
標準偏差	1.42	1.42	1.42	1.56	1.44	1.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査