

表 1319 大腿骨頸部骨折の既往 PTH値(pg/mL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	7,576 (94.9)	407 (5.1)	7,983 (100.0)	21	1,508	9,512
20～ (%)	10,971 (95.0)	576 (5.0)	11,547 (100.0)	35	2,147	13,729
40～ (%)	11,576 (94.9)	626 (5.1)	12,202 (100.0)	43	2,280	14,525
60～ (%)	12,482 (95.3)	610 (4.7)	13,092 (100.0)	49	2,373	15,514
80～ (%)	12,545 (95.6)	581 (4.4)	13,126 (100.0)	63	2,482	15,671
100～ (%)	12,190 (95.7)	549 (4.3)	12,739 (100.0)	40	2,492	15,271
120～ (%)	11,684 (95.7)	524 (4.3)	12,208 (100.0)	62	2,316	14,586
140～ (%)	10,732 (95.5)	511 (4.5)	11,243 (100.0)	49	2,211	13,503
160～ (%)	9,666 (95.8)	419 (4.2)	10,085 (100.0)	48	1,974	12,107
180～ (%)	21,921 (96.1)	879 (3.9)	22,800 (100.0)	93	4,535	27,428
240～ (%)	257 (92.4)	21 (7.6)	278 (100.0)	1	59	338
241～ (%)	12,463 (96.2)	491 (3.8)	12,954 (100.0)	45	2,599	15,598
300～ (%)	7,220 (96.5)	264 (3.5)	7,484 (100.0)	23	1,485	8,992
360～ (%)	4,096 (95.8)	181 (4.2)	4,277 (100.0)	17	830	5,124
420～ (%)	2,426 (96.3)	93 (3.7)	2,519 (100.0)	12	493	3,024
480～ (%)	582 (95.4)	28 (4.6)	610 (100.0)	3	123	736
500～ (%)	949 (96.6)	33 (3.4)	982 (100.0)	3	204	1,189
540～ (%)	1,037 (95.8)	45 (4.2)	1,082 (100.0)	4	224	1,310
600～ (%)	1,705 (95.5)	80 (4.5)	1,785 (100.0)	4	343	2,132
800～ (%)	1,327 (95.7)	59 (4.3)	1,386 (100.0)	4	232	1,622
合計 (%)	153,405 (95.6)	6,977 (4.4)	160,382 (100.0)	619	30,910	191,911
記載なし (%)	3,010 (94.9)	163 (5.1)	3,173 (100.0)	37	1,465	4,675
総計 (%)	156,415 (95.6)	7,140 (4.4)	163,555 (100.0)	656	32,375	196,586
平均	170.10	162.71	169.78	171.21	170.94	169.97
標準偏差	160.28	190.96	161.74	193.40	156.16	160.97

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査