

表 1322 大腿骨頸部骨折の既往 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

総コレステロール濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)	5,033 (94.0)	324 (6.0)	5,357 (100.0)	26	1,071	6,454
100～ (%)	14,614 (94.9)	781 (5.1)	15,395 (100.0)	47	3,178	18,620
120～ (%)	27,110 (95.3)	1,324 (4.7)	28,434 (100.0)	76	5,805	34,315
140～ (%)	30,744 (95.8)	1,362 (4.2)	32,106 (100.0)	71	6,649	38,826
160～ (%)	25,188 (95.9)	1,072 (4.1)	26,260 (100.0)	50	5,273	31,583
180～ (%)	15,553 (96.1)	630 (3.9)	16,183 (100.0)	30	3,406	19,619
200～ (%)	8,045 (95.9)	344 (4.1)	8,389 (100.0)	15	1,805	10,209
220～ (%)	3,511 (95.9)	151 (4.1)	3,662 (100.0)	5	808	4,475
240～ (%)	1,375 (96.2)	55 (3.8)	1,430 (100.0)	2	301	1,733
260～ (%)	860 (96.1)	35 (3.9)	895 (100.0)	6	210	1,111
合計 (%)	132,033 (95.6)	6,078 (4.4)	138,111 (100.0)	328	28,506	166,945
記載なし (%)	46,994 (95.6)	2,155 (4.4)	49,149 (100.0)	475	12,402	62,026
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	154.78	151.30	154.62	148.35	155.23	154.71
標準偏差	35.13	35.83	35.17	38.64	35.77	35.28

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査