

表 1323 大腿骨頸部骨折の既往 HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	518	41	559	5	107	671
(%)	(92.7)	(7.3)	(100.0)			
20～	10,336	475	10,811	35	2,000	12,846
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
30～	29,569	1,388	30,957	111	5,820	36,888
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
40～	32,546	1,580	34,126	112	6,491	40,729
(%)	(95.4)	(4.6)	(100.0)			
50～	23,187	1,067	24,254	85	4,741	29,080
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
60～	13,466	540	14,006	40	2,746	16,792
(%)	(96.1)	(3.9)	(100.0)			
70～	6,555	238	6,793	24	1,384	8,201
(%)	(96.5)	(3.5)	(100.0)			
80～	3,057	100	3,157	10	667	3,834
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
90～	1,344	44	1,388	1	344	1,733
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
100～	1,079	43	1,122		336	1,458
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
合計	121,657	5,516	127,173	423	24,636	152,232
(%)	(95.7)	(4.3)	(100.0)			
記載なし	57,370	2,717	60,087	380	16,272	76,739
(%)	(95.5)	(4.5)	(100.0)			
総計	179,027	8,233	187,260	803	40,908	228,971
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
平均	48.16	46.91	48.11	46.31	49.04	48.25
標準偏差	16.40	15.57	16.36	14.43	17.45	16.54

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査