

表 1324 大腿骨頸部骨折の既往 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

Non-HDL-C濃度	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
50未満 (%)	2,124 (95.0)	112 (5.0)	2,236 (100.0)	9	471	2,716
50～ (%)	10,068 (95.2)	513 (4.8)	10,581 (100.0)	42	2,283	12,906
70～ (%)	22,448 (95.2)	1,130 (4.8)	23,578 (100.0)	59	4,895	28,532
90～ (%)	26,568 (95.5)	1,250 (4.5)	27,818 (100.0)	79	5,682	33,579
110～ (%)	21,281 (95.7)	946 (4.3)	22,227 (100.0)	56	4,396	26,679
130～ (%)	12,887 (96.0)	535 (4.0)	13,422 (100.0)	26	2,685	16,133
150～ (%)	6,371 (96.1)	257 (3.9)	6,628 (100.0)	17	1,398	8,043
170～ (%)	2,857 (96.0)	119 (4.0)	2,976 (100.0)	3	588	3,567
190～ (%)	1,083 (96.7)	37 (3.3)	1,120 (100.0)	2	216	1,338
210～ (%)	630 (95.3)	31 (4.7)	661 (100.0)	5	166	832
合計 (%)	106,317 (95.6)	4,930 (4.4)	111,247 (100.0)	298	22,780	134,325
記載なし (%)	72,710 (95.7)	3,303 (4.3)	76,013 (100.0)	505	18,128	94,646
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	106.62	104.04	106.51	102.44	106.14	106.43
標準偏差	33.23	32.87	33.22	35.48	33.75	33.32

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査