

表 1325 大腿骨頸部骨折の既往 透析前収縮期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前収縮 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (100.0)		27 (100.0)		8	35
60～ (%)	207 (92.0)	18 (8.0)	225 (100.0)	1	45	271
80～ (%)	1,824 (92.5)	147 (7.5)	1,971 (100.0)	6	400	2,377
100～ (%)	10,384 (94.6)	593 (5.4)	10,977 (100.0)	23	2,155	13,155
120～ (%)	33,216 (95.3)	1,620 (4.7)	34,836 (100.0)	90	6,650	41,576
140～ (%)	51,764 (96.0)	2,180 (4.0)	53,944 (100.0)	137	10,122	64,203
160～ (%)	37,525 (95.8)	1,629 (4.2)	39,154 (100.0)	101	7,588	46,843
180～ (%)	14,369 (95.4)	696 (4.6)	15,065 (100.0)	46	2,891	18,002
200～ (%)	3,627 (95.9)	157 (4.1)	3,784 (100.0)	9	722	4,515
220～ (%)	713 (95.6)	33 (4.4)	746 (100.0)	2	146	894
合計 (%)	153,656 (95.6)	7,073 (4.4)	160,729 (100.0)	415	30,727	191,871
記載なし (%)	25,371 (95.6)	1,160 (4.4)	26,531 (100.0)	388	10,181	37,100
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	151.71	150.00	151.64	152.30	151.65	151.64
標準偏差	23.92	25.39	23.99	24.83	24.17	24.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査