

表 1326 大腿骨頸部骨折の既往 透析前拡張期血圧(mmHg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

透析前拡張 期血圧	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	49 (89.1)	6 (10.9)	55 (100.0)		12	67
20～ (%)	458 (92.0)	40 (8.0)	498 (100.0)	4	110	612
40～ (%)	12,701 (93.0)	959 (7.0)	13,660 (100.0)	32	2,665	16,357
60～ (%)	71,405 (95.0)	3,724 (5.0)	75,129 (100.0)	223	14,273	89,625
80～ (%)	37,887 (96.5)	1,368 (3.5)	39,255 (100.0)	78	7,507	46,840
90～ (%)	20,242 (96.8)	664 (3.2)	20,906 (100.0)	46	3,996	24,948
100～ (%)	9,873 (97.3)	277 (2.7)	10,150 (100.0)	28	1,964	12,142
120～ (%)	614 (97.9)	13 (2.1)	627 (100.0)	2	112	741
140～ (%)	49 (100.0)		49 (100.0)		8	57
合計 (%)	153,278 (95.6)	7,051 (4.4)	160,329 (100.0)	413	30,647	191,389
記載なし (%)	25,749 (95.6)	1,182 (4.4)	26,931 (100.0)	390	10,261	37,582
総計 (%)	179,027 (95.6)	8,233 (4.4)	187,260 (100.0)	803	40,908	228,971
平均	77.73	73.66	77.55	76.31	77.63	77.56
標準偏差	14.36	14.24	14.38	14.67	14.44	14.39

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査