

表 1327 大腿骨頸部骨折の既往 透析前脈拍(拍/分)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回)

| 透析前脈拍       | 既往なし              | 既往あり           | 合計                 | 不明    | 記載なし   | 総計      |
|-------------|-------------------|----------------|--------------------|-------|--------|---------|
| 40未満<br>(%) | 120<br>(93.0)     | 9<br>(7.0)     | 129<br>(100.0)     |       | 26     | 155     |
| 40～<br>(%)  | 1,538<br>(94.5)   | 89<br>(5.5)    | 1,627<br>(100.0)   |       | 302    | 1,929   |
| 50～<br>(%)  | 12,757<br>(95.5)  | 597<br>(4.5)   | 13,354<br>(100.0)  | 36    | 2,383  | 15,773  |
| 60～<br>(%)  | 39,172<br>(95.3)  | 1,918<br>(4.7) | 41,090<br>(100.0)  | 96    | 7,555  | 48,741  |
| 70～<br>(%)  | 46,750<br>(95.5)  | 2,227<br>(4.5) | 48,977<br>(100.0)  | 129   | 9,078  | 58,184  |
| 80～<br>(%)  | 29,306<br>(95.8)  | 1,270<br>(4.2) | 30,576<br>(100.0)  | 88    | 6,059  | 36,723  |
| 90～<br>(%)  | 12,797<br>(96.1)  | 526<br>(3.9)   | 13,323<br>(100.0)  | 39    | 2,556  | 15,918  |
| 100～<br>(%) | 4,007<br>(96.6)   | 142<br>(3.4)   | 4,149<br>(100.0)   | 13    | 742    | 4,904   |
| 110～<br>(%) | 939<br>(96.4)     | 35<br>(3.6)    | 974<br>(100.0)     | 3     | 180    | 1,157   |
| 120～<br>(%) | 416<br>(95.9)     | 18<br>(4.1)    | 434<br>(100.0)     | 1     | 63     | 498     |
| 合計<br>(%)   | 147,802<br>(95.6) | 6,831<br>(4.4) | 154,633<br>(100.0) | 405   | 28,944 | 183,982 |
| 記載なし<br>(%) | 31,225<br>(95.7)  | 1,402<br>(4.3) | 32,627<br>(100.0)  | 398   | 11,964 | 44,989  |
| 総計<br>(%)   | 179,027<br>(95.6) | 8,233<br>(4.4) | 187,260<br>(100.0) | 803   | 40,908 | 228,971 |
| 平均          | 74.50             | 73.67          | 74.46              | 75.68 | 74.69  | 74.50   |
| 標準偏差        | 12.84             | 12.47          | 12.82              | 12.80 | 12.66  | 12.80   |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査