

表 1329 大腿骨頸部骨折の既往 年齢(歳)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

年齢	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	2 (100.0)	1 (0.8)	2 (100.0)			2
15歳～ (%)	129 (99.2)	1 (0.8)	130 (100.0)		32	162
30歳～ (%)	2,048 (99.1)	19 (0.9)	2,067 (100.0)	1	420	2,488
45歳～ (%)	7,383 (98.6)	103 (1.4)	7,486 (100.0)	5	1,682	9,173
60歳～ (%)	14,813 (96.8)	491 (3.2)	15,304 (100.0)	20	3,690	19,014
75歳～ (%)	6,567 (93.0)	496 (7.0)	7,063 (100.0)	13	1,678	8,754
90歳～ (%)	234 (82.7)	49 (17.3)	283 (100.0)		67	350
合計 (%)	31,176 (96.4)	1,159 (3.6)	32,335 (100.0)	39	7,569	39,943
不明 (%)	2 (66.7)	1 (33.3)	3 (100.0)			3
記載なし (%)						
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	64.60	72.67	64.89	70.26	65.32	64.98
標準偏差	12.37	10.93	12.42	10.98	12.19	12.38

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査