

表 1330 大腿骨頸部骨折の既往 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析歴	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
2年未満 (%)	3,957 (98.1)	75 (1.9)	4,032 (100.0)	6	926	4,964
2年～ (%)	6,781 (96.8)	225 (3.2)	7,006 (100.0)	9	1,600	8,615
5年～ (%)	7,802 (95.9)	336 (4.1)	8,138 (100.0)	4	1,974	10,116
10年～ (%)	4,867 (96.0)	202 (4.0)	5,069 (100.0)	8	1,117	6,194
15年～ (%)	3,064 (97.3)	85 (2.7)	3,149 (100.0)	6	769	3,924
20年～ (%)	2,058 (97.2)	59 (2.8)	2,117 (100.0)	2	518	2,637
25年～ (%)	1,281 (94.9)	69 (5.1)	1,350 (100.0)	1	300	1,651
30年～ (%)	849 (94.1)	53 (5.9)	902 (100.0)	2	219	1,123
35年～ (%)	428 (90.7)	44 (9.3)	472 (100.0)	1	114	587
40年～ (%)	86 (87.8)	12 (12.2)	98 (100.0)		26	124
合計 (%)	31,173 (96.4)	1,160 (3.6)	32,333 (100.0)	39	7,563	39,935
不明 (%)	5 (100.0)		5 (100.0)		6	11
記載なし (%)						
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	9.93	11.86	10.00	11.10	10.10	10.02
標準偏差	8.80	10.18	8.86	9.94	8.92	8.87

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査