

表 1331 大腿骨頭部骨折の既往 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
慢性糸球体腎炎	11,836	415	12,251	14	2,811	15,076
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
慢性腎盂腎炎	331	13	344		78	422
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
急速進行性糸球体腎炎	221	6	227		57	284
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
妊娠腎/妊娠中毒症	264	13	277	2	80	359
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
その他の分類不能の腎炎	154	4	158		37	195
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
多発性嚢胞腎	1,146	36	1,182	1	281	1,464
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎硬化症	2,264	103	2,367	2	517	2,886
(%)	(95.6)	(4.4)	(100.0)			
悪性高血圧	239	7	246	1	65	312
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
糖尿病性腎症	10,268	401	10,669	10	2,494	13,173
(%)	(96.2)	(3.8)	(100.0)			
SLE腎炎	296	16	312	1	50	363
(%)	(94.9)	(5.1)	(100.0)			
アミロイド腎	45	4	49		10	59
(%)	(91.8)	(8.2)	(100.0)			
痛風腎	127	2	129	1	24	154
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
先天性代謝異常による腎不全	32	1	33		11	44
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
腎・尿路結核	18		18		4	22
(%)	(100.0)		(100.0)			
腎・尿路結石	57	2	59		10	69
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
腎・尿路腫瘍	73		73		12	85
(%)	(100.0)		(100.0)			
閉塞性尿路障害	61	1	62		12	74
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
骨髄腫	15	2	17		2	19
(%)	(88.2)	(11.8)	(100.0)			
腎形成不全	83	1	84		17	101
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
不明	2,640	94	2,734	4	742	3,480
(%)	(96.6)	(3.4)	(100.0)			
再導入	336	14	350		66	416
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
その他	672	25	697	3	189	889
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
合計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし						
(%)						
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査