

表 1334 大腿骨頸部骨折の既往 喫煙の有無別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

| 喫煙の有無           | 既往なし             | 既往あり           | 合計                | 不明 | 記載なし  | 総計     |
|-----------------|------------------|----------------|-------------------|----|-------|--------|
| 現在吸っていない<br>(%) | 24,804<br>(96.5) | 908<br>(3.5)   | 25,712<br>(100.0) | 17 | 1,272 | 27,001 |
| 現在吸っている<br>(%)  | 3,723<br>(98.0)  | 76<br>(2.0)    | 3,799<br>(100.0)  |    | 257   | 4,056  |
| 合計<br>(%)       | 28,527<br>(96.7) | 984<br>(3.3)   | 29,511<br>(100.0) | 17 | 1,529 | 31,057 |
| 不明<br>(%)       | 1,877<br>(97.8)  | 43<br>(2.2)    | 1,920<br>(100.0)  | 22 | 275   | 2,217  |
| 記載なし<br>(%)     | 774<br>(85.3)    | 133<br>(14.7)  | 907<br>(100.0)    |    | 5,765 | 6,672  |
| 総計<br>(%)       | 31,178<br>(96.4) | 1,160<br>(3.6) | 32,338<br>(100.0) | 39 | 7,569 | 39,946 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査