

表 1337 大腿骨頸部骨折の既往 透析時間(時間/回)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

透析時間	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
3.0未満	78	5	83		9	92
(%)	(94.0)	(6.0)	(100.0)			
3.0～	1,713	105	1,818	3	461	2,282
(%)	(94.2)	(5.8)	(100.0)			
3.5～	1,939	108	2,047	3	429	2,479
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
4.0～	20,532	768	21,300	28	5,106	26,434
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
4.5～	3,161	92	3,253	1	594	3,848
(%)	(97.2)	(2.8)	(100.0)			
5.0～	3,242	64	3,306	3	723	4,032
(%)	(98.1)	(1.9)	(100.0)			
5.5～	192	3	195		23	218
(%)	(98.5)	(1.5)	(100.0)			
6.0～	246	8	254		30	284
(%)	(96.9)	(3.1)	(100.0)			
6.5～	15		15		2	17
(%)	(100.0)		(100.0)			
7.0～	31		31		5	36
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	31,149	1,153	32,302	38	7,382	39,722
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	29	7	36	1	187	224
(%)	(80.6)	(19.4)	(100.0)			
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	4.11	3.98	4.10	3.98	4.08	4.10
標準偏差	0.51	0.48	0.51	0.43	0.48	0.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査