

表 1338 大腿骨頸部骨折の既往 血流量(ml/分)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回)

血流量	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)					1	1
100～ (%)	32 (94.1)	2 (5.9)	34 (100.0)		3	37
120～ (%)	72 (86.7)	11 (13.3)	83 (100.0)		11	94
140～ (%)	1,012 (91.7)	91 (8.3)	1,103 (100.0)	3	236	1,342
160～ (%)	425 (92.2)	36 (7.8)	461 (100.0)	1	116	578
180～ (%)	2,142 (93.7)	144 (6.3)	2,286 (100.0)	5	655	2,946
200～ (%)	10,561 (95.6)	483 (4.4)	11,044 (100.0)	15	2,488	13,547
220～ (%)	5,301 (97.4)	144 (2.6)	5,445 (100.0)	5	1,157	6,607
240～ (%)	7,340 (97.7)	171 (2.3)	7,511 (100.0)	6	1,610	9,127
260～ (%)	891 (97.8)	20 (2.2)	911 (100.0)	1	166	1,078
280～ (%)	828 (98.5)	13 (1.5)	841 (100.0)		179	1,020
300～ (%)	2,075 (98.4)	33 (1.6)	2,108 (100.0)	1	356	2,465
350～ (%)	286 (99.7)	1 (0.3)	287 (100.0)		58	345
400～ (%)	158 (98.8)	2 (1.3)	160 (100.0)		42	202
合計 (%)	31,123 (96.4)	1,151 (3.6)	32,274 (100.0)	37	7,078	39,389
記載なし (%)	55 (85.9)	9 (14.1)	64 (100.0)	2	491	557
総計 (%)	31,178 (96.4)	1,160 (3.6)	32,338 (100.0)	39	7,569	39,946
平均	225.31	207.36	224.67	207.30	222.02	224.18
標準偏差	40.57	35.78	40.54	33.05	39.44	40.35

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査