

表 1340 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回)

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満	5		5		1	6
(%)	(100.0)		(100.0)			
130～	5		5		3	8
(%)	(100.0)		(100.0)			
135～	7	1	8		1	9
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
140～	35	5	40		5	45
(%)	(87.5)	(12.5)	(100.0)			
145～	145	5	150		40	190
(%)	(96.7)	(3.3)	(100.0)			
150～	816	34	850		170	1,020
(%)	(96.0)	(4.0)	(100.0)			
155～	2,287	75	2,362	2	438	2,802
(%)	(96.8)	(3.2)	(100.0)			
160～	4,660	124	4,784	4	922	5,710
(%)	(97.4)	(2.6)	(100.0)			
165～	5,287	116	5,403	5	996	6,404
(%)	(97.9)	(2.1)	(100.0)			
170～	3,919	65	3,984	4	743	4,731
(%)	(98.4)	(1.6)	(100.0)			
175～	1,458	27	1,485	1	284	1,770
(%)	(98.2)	(1.8)	(100.0)			
180～	407	9	416		72	488
(%)	(97.8)	(2.2)	(100.0)			
185～	61	3	64	1	12	77
(%)	(95.3)	(4.7)	(100.0)			
190～	7		7		2	9
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	19,099	464	19,563	17	3,689	23,269
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
記載なし	844	22	866	4	1,055	1,925
(%)	(97.5)	(2.5)	(100.0)			
総計	19,943	486	20,429	21	4,744	25,194
(%)	(97.6)	(2.4)	(100.0)			
平均	165.75	163.91	165.70	167.82	165.60	165.69
標準偏差	7.03	7.63	7.05	6.91	7.15	7.07

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査