

表 1341 大腿骨頸部骨折の既往 身長(cm)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回)

身長	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
130未満 (%)	25 (86.2)	4 (13.8)	29 (100.0)		3	32
130～ (%)	41 (91.1)	4 (8.9)	45 (100.0)		17	62
135～ (%)	220 (92.1)	19 (7.9)	239 (100.0)		41	280
140～ (%)	852 (91.5)	79 (8.5)	931 (100.0)	3	184	1,118
145～ (%)	2,150 (93.0)	162 (7.0)	2,312 (100.0)	4	489	2,805
150～ (%)	3,325 (94.3)	200 (5.7)	3,525 (100.0)	4	663	4,192
155～ (%)	2,627 (95.7)	119 (4.3)	2,746 (100.0)	5	526	3,277
160～ (%)	1,194 (96.1)	48 (3.9)	1,242 (100.0)	1	224	1,467
165～ (%)	258 (97.7)	6 (2.3)	264 (100.0)		54	318
170～ (%)	48 (100.0)		48 (100.0)		6	54
175～ (%)	13 (100.0)		13 (100.0)		3	16
180～ (%)	5 (100.0)		5 (100.0)			5
185～ (%)						
190～ (%)						
合計 (%)	10,758 (94.4)	641 (5.6)	11,399 (100.0)	17	2,210	13,626
記載なし (%)	477 (93.5)	33 (6.5)	510 (100.0)	1	615	1,126
総計 (%)	11,235 (94.3)	674 (5.7)	11,909 (100.0)	18	2,825	14,752
平均	152.44	150.35	152.33	150.82	152.06	152.28
標準偏差	6.88	6.52	6.88	6.06	6.97	6.89

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査