

表 1342 大腿骨頸部骨折の既往 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

透析後体重	既往なし	既往あり	合計	不明	記載なし	総計
20未満	8		8		4	12
(%)	(100.0)		(100.0)			
20～	58	7	65		11	76
(%)	(89.2)	(10.8)	(100.0)			
30～	1,995	204	2,199	8	475	2,682
(%)	(90.7)	(9.3)	(100.0)			
40～	7,804	435	8,239	8	1,758	10,005
(%)	(94.7)	(5.3)	(100.0)			
50～	9,951	308	10,259	10	2,221	12,490
(%)	(97.0)	(3.0)	(100.0)			
60～	6,751	137	6,888	7	1,470	8,365
(%)	(98.0)	(2.0)	(100.0)			
70～	2,821	35	2,856	2	565	3,423
(%)	(98.8)	(1.2)	(100.0)			
80～	1,059	14	1,073	1	199	1,273
(%)	(98.7)	(1.3)	(100.0)			
90～	371	3	374		81	455
(%)	(99.2)	(0.8)	(100.0)			
100～	112	1	113		29	142
(%)	(99.1)	(0.9)	(100.0)			
110～	52		52		9	61
(%)	(100.0)		(100.0)			
120～	32		32		5	37
(%)	(100.0)		(100.0)			
合計	31,014	1,144	32,158	36	6,827	39,021
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
記載なし	164	16	180	3	742	925
(%)	(91.1)	(8.9)	(100.0)			
総計	31,178	1,160	32,338	39	7,569	39,946
(%)	(96.4)	(3.6)	(100.0)			
平均	56.94	49.79	56.69	52.57	56.35	56.63
標準偏差	13.07	11.09	13.07	12.66	12.85	13.03

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査